


Artigas Lacabanne*

R E S U M E N

Se describe un caso de tétanos en un bovino hembra. La anamnesis y los síntomas característicos llevan al diagnóstico.



A. sanitaria. — Los animales están vacunados de acuerdo a la obligatoriedad del plan de leche calificada.


A. colectiva. — Hacía tres años, se había diagnosticado Pododermatitis infecciosa con tratamiento exitoso. Actualmente sin particularidades.

A. individual. — Un aborto quince días atrás, en el cual se produce un prolapso vaginal reducido espontáneamente una vez incorporado el animal, al cabo de 30 minutos de decúbito. Dicho aborto, de origen presumiblemente traumático, se produce en el corral de espera del galpón de ordeño en cuyo alrededor se amontona el estiércol.

INTRODUCCION

Motivó la consulta, la dificultad locomotora en un animal vacuno lechero. Este animal, vaca cruzada Holando de seis años, en producción, estaba junto a 65 vacas en un potrero de campo natural fertilizado.

Anamnesis regional. — No existen datos que posibilitem sospechar casos semejantes.



* Técnico de Sanidad Animal. MAP. Libertad, San José, Uruguay.

Examen objetivo general y particular. El animal en estudio, está apartado del rodeo y anorético. Es notoria, una dificultad locomotora, sobre todo del tren posterior. Es manifiesto el trismo (rigidez mandibular) así como la cola erecta, dificultad de retroceder y girar; tonicidad muscular permanente e hiperestesia. Hay prolapso del tercer párpado. La respiración del animal es de tipo abdominal, superficial y acelerada.

Se le trata con penicilina en dosis altas, sin resultados y por carecerse de suero antitetánico, no se usa. Ocho días después del comienzo de los síntomas, muere.

DIAGNOSTICO

Se descartó la intoxicación por estricnina dada la evolución del caso y la historia clínica.



DISCUSION

De acuerdo a autores consultados, esta enfermedad de aparición rara en bovinos tiene su puerta de entrada en heridas de las vías genitales. (1,2) En el caso que nos ocupa se confirma la relación del trauma y aborto con prolapso con el tétano bovino, hecho ya observado por varios autores.

La bajísima incidencia no exige vacunar sistemáticamente contra el tétanos al stock ganadero, obligando a una desinfección a fondo de toda herida, preferentemente del tracto genital.

REFERENCIAS

- 1) Blood Henderson - Medicina Veterinaria. Edición en español Trad. Dr. Fernando Colchero - Interamericana 364,366, 1965.
- 2) E. Wiesner - Enfermedades del ganado bovino, 134, 135 - Editorial, ACRIBIA. 1969.



kalvono

NUEVO SAGUAYPICIDA ORAL
DE ALTA EFECTIVIDAD

LABORATORIOS DISPERT S. A.

Av. Garibaldi 2797

Montevideo - Uruguay — DIVISION VETERINARIA

